



**DISPOGEL (14x18 – 14x24 – 11x26) cm**

**CS: GELOVÝ SÁČEK HORKÝ/STUDENÝ**

**HORKÉ – INDIKACE:**

Lumbago, ztuhlý krk, revmatismus, podchlazení a kdykoli je nutná horká aplikace.

**NÁVOD – HORKÁ VODA**

Gelový sáček ponořte do vroucí vody maximálně na 5 minut. Vyjměte jej, otřete, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**NÁVOD – MIKROVLNNÁ TROUBA**

Vložte sáček do mikrovlnné trouby maximálně na 1 minutu při 650 W. Vyndejte a jemně s ním zatřeste, aby se teplo rovnoměrně rozložilo. Vložte sáček do specifické kapsy nebo látky a podle potřeby aplikujte.

**STUDENÉ – INDIKACE:**

Hematomy, podvrtnutí, poranění, hypertermie a kdykoli je zapotřebí aplikace za studena.

**NÁVOD – MRAZÁK:**

Vložte gelový sáček do mrazáku na dobu nejméně 2 hodiny. Vyjměte jej, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**POZOR**

Nepolykejte obsah, neroztrhněte sáček. Uchovávejte mimo dosah dětí. Gelový sáček vždy vkládejte do kapsy nebo jej zabalte do látky, aby nedošlo k popálení. Před použitím u kojenců, dětí, starších osob a osob postižených cukrovkou, kardiovaskulárními a oběhovými poruchami nebo necitlivostí kůže (Raynaudův syndrom) se poraďte s lékařem. Pokud máte pochybnosti o provedení léčby nebo pokud symptomatologie přetrvává, poraďte se s lékařem. Neaplikujte na poraněnou pokožku. Pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte opakovaně, pokud je sáček poškozen (např. díry, roztržení). V případě, že při používání zdravotnického prostředku dojde k vážné bezpečnostní události, nahláste to výrobcí a příslušnému orgánu ve vaší zemi.



: CS: Zdravotní prostředek



**Dispotech Srl**  
Via al Piano 29,  
23020 Gordona (SO), Italy

**Distributor ČR:**  
BEXAMED s.r.o.,  
Míranova 148/10,  
102 00 Praha 10 – Hostivař,  
www.bexamed.cz  
Poslední revize textu: listopad 2021



**DISPOGEL (14x18 – 14x24 – 11x26) cm**

**CS: GELOVÝ SÁČEK HORKÝ/STUDENÝ**

**HORKÉ – INDIKACE:**

Lumbago, ztuhlý krk, revmatismus, podchlazení a kdykoli je nutná horká aplikace.

**NÁVOD – HORKÁ VODA**

Gelový sáček ponořte do vroucí vody maximálně na 5 minut. Vyjměte jej, otřete, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**NÁVOD – MIKROVLNNÁ TROUBA**

Vložte sáček do mikrovlnné trouby maximálně na 1 minutu při 650 W. Vyndejte a jemně s ním zatřeste, aby se teplo rovnoměrně rozložilo. Vložte sáček do specifické kapsy nebo látky a podle potřeby aplikujte.

**STUDENÉ – INDIKACE:**

Hematomy, podvrtnutí, poranění, hypertermie a kdykoli je zapotřebí aplikace za studena.

**NÁVOD – MRAZÁK:**

Vložte gelový sáček do mrazáku na dobu nejméně 2 hodiny. Vyjměte jej, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**POZOR**

Nepolykejte obsah, neroztrhněte sáček. Uchovávejte mimo dosah dětí. Gelový sáček vždy vkládejte do kapsy nebo jej zabalte do látky, aby nedošlo k popálení. Před použitím u kojenců, dětí, starších osob a osob postižených cukrovkou, kardiovaskulárními a oběhovými poruchami nebo necitlivostí kůže (Raynaudův syndrom) se poraďte s lékařem. Pokud máte pochybnosti o provedení léčby nebo pokud symptomatologie přetrvává, poraďte se s lékařem. Neaplikujte na poraněnou pokožku. Pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte opakovaně, pokud je sáček poškozen (např. díry, roztržení). V případě, že při používání zdravotnického prostředku dojde k vážné bezpečnostní události, nahláste to výrobcí a příslušnému orgánu ve vaší zemi.



: CS: Zdravotní prostředek



**Dispotech Srl**  
Via al Piano 29,  
23020 Gordona (SO), Italy

**Distributor ČR:**  
BEXAMED s.r.o.,  
Míranova 148/10,  
102 00 Praha 10 – Hostivař,  
www.bexamed.cz  
Poslední revize textu: listopad 2021



**DISPOGEL (14x18 – 14x24 – 11x26) cm**

**CS: GELOVÝ SÁČEK HORKÝ/STUDENÝ**

**HORKÉ – INDIKACE:**

Lumbago, ztuhlý krk, revmatismus, podchlazení a kdykoli je nutná horká aplikace.

**NÁVOD – HORKÁ VODA**

Gelový sáček ponořte do vroucí vody maximálně na 5 minut. Vyjměte jej, otřete, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**NÁVOD – MIKROVLNNÁ TROUBA**

Vložte sáček do mikrovlnné trouby maximálně na 1 minutu při 650 W. Vyndejte a jemně s ním zatřeste, aby se teplo rovnoměrně rozložilo. Vložte sáček do specifické kapsy nebo látky a podle potřeby aplikujte.

**STUDENÉ – INDIKACE:**

Hematomy, podvrtnutí, poranění, hypertermie a kdykoli je zapotřebí aplikace za studena.

**NÁVOD – MRAZÁK:**

Vložte gelový sáček do mrazáku na dobu nejméně 2 hodiny. Vyjměte jej, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**POZOR**

Nepolykejte obsah, neroztrhněte sáček. Uchovávejte mimo dosah dětí. Gelový sáček vždy vkládejte do kapsy nebo jej zabalte do látky, aby nedošlo k popálení. Před použitím u kojenců, dětí, starších osob a osob postižených cukrovkou, kardiovaskulárními a oběhovými poruchami nebo necitlivostí kůže (Raynaudův syndrom) se poraďte s lékařem. Pokud máte pochybnosti o provedení léčby nebo pokud symptomatologie přetrvává, poraďte se s lékařem. Neaplikujte na poraněnou pokožku. Pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte opakovaně, pokud je sáček poškozen (např. díry, roztržení). V případě, že při používání zdravotnického prostředku dojde k vážné bezpečnostní události, nahláste to výrobcí a příslušnému orgánu ve vaší zemi.



: CS: Zdravotní prostředek



**Dispotech Srl**  
Via al Piano 29,  
23020 Gordona (SO), Italy

**Distributor ČR:**  
BEXAMED s.r.o.,  
Míranova 148/10,  
102 00 Praha 10 – Hostivař,  
www.bexamed.cz  
Poslední revize textu: listopad 2021



**DISPOGEL (14x18 – 14x24 – 11x26) cm**

**CS: GELOVÝ SÁČEK HORKÝ/STUDENÝ**

**HORKÉ – INDIKACE:**

Lumbago, ztuhlý krk, revmatismus, podchlazení a kdykoli je nutná horká aplikace.

**NÁVOD – HORKÁ VODA**

Gelový sáček ponořte do vroucí vody maximálně na 5 minut. Vyjměte jej, otřete, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**NÁVOD – MIKROVLNNÁ TROUBA**

Vložte sáček do mikrovlnné trouby maximálně na 1 minutu při 650 W. Vyndejte a jemně s ním zatřeste, aby se teplo rovnoměrně rozložilo. Vložte sáček do specifické kapsy nebo látky a podle potřeby aplikujte.

**STUDENÉ – INDIKACE:**

Hematomy, podvrtnutí, poranění, hypertermie a kdykoli je zapotřebí aplikace za studena.

**NÁVOD – MRAZÁK:**

Vložte gelový sáček do mrazáku na dobu nejméně 2 hodiny. Vyjměte jej, vložte do kapsy na něj nebo zabalte do látky a podle potřeby aplikujte.

**POZOR**

Nepolykejte obsah, neroztrhněte sáček. Uchovávejte mimo dosah dětí. Gelový sáček vždy vkládejte do kapsy nebo jej zabalte do látky, aby nedošlo k popálení. Před použitím u kojenců, dětí, starších osob a osob postižených cukrovkou, kardiovaskulárními a oběhovými poruchami nebo necitlivostí kůže (Raynaudův syndrom) se poraďte s lékařem. Pokud máte pochybnosti o provedení léčby nebo pokud symptomatologie přetrvává, poraďte se s lékařem. Neaplikujte na poraněnou pokožku. Pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte opakovaně, pokud je sáček poškozen (např. díry, roztržení). V případě, že při používání zdravotnického prostředku dojde k vážné bezpečnostní události, nahláste to výrobcí a příslušnému orgánu ve vaší zemi.



: CS: Zdravotní prostředek



**Dispotech Srl**  
Via al Piano 29,  
23020 Gordona (SO), Italy

**Distributor ČR:**  
BEXAMED s.r.o.,  
Míranova 148/10,  
102 00 Praha 10 – Hostivař,  
www.bexamed.cz  
Poslední revize textu: listopad 2021